



โรงพยาบาลศิริราช

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๐๑

แก้ไขครั้งที่ : ๐๒

เรื่อง : แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเข้า ER/OPD/LR

วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER/OPD/LR

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ

นโยบาย

เพื่อให้พยาบาลคัดกรองใช้เป็นแนวทางการคัดกรอง ประเมินผู้ป่วยและส่งผู้ป่วยไปยังหน่วยงานต่างๆได้

ถูกต้อง

วิธีปฏิบัติ

ผู้ป่วยที่มีอาการ อาการแสดง สัญญาณชีพ ดังต่อไปนี้ให้ส่งเข้าหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ยกเว้นที่ระบุไว้

1. ผู้ป่วยที่สงสัย เป็น MI (ตามแนวทางการคัดกรอง ผู้ป่วย MI)
2. ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ทุกราย ผู้ป่วยถูกทำร้ายร่างกายและผู้ป่วยคดี
3. ผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางช่องคลอด

- ผล UPT positive

- = st half bleeding (อายุครรภ์น้อย ๒๐ wks) เข้า ER
- = ๒nd half bleeding (อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๘ wks) เข้า LR
- = ๒nd half bleeding (อายุครรภ์น้อยกว่า ๒๘ wks) เข้า ER

- ไม่ทราบผล UPT

- = สัญญาณ V/S ปกติ มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย ส่ง OPD
- = สัญญาณ V/S ไม่ปกติ Active Bleed หรือมาด้วยอุบัติเหตุ เข้า ER

๔. เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีไข้ ≥ 38.5 C
๕. เด็ก ๐-๒ เดือน RR ≥ 60 ครั้ง/ นาที
๖. เด็ก ๒ เดือน - ๑ ปี RR ≥ 50 ครั้ง/ นาที
๗. เด็ก ๑ - ๕ ปี RR ≥ 40 ครั้ง/ นาที
๘. ผู้ใหญ่ที่มีภาวะหายใจเหนื่อยหอบ RR ≥ 30 ครั้ง/ นาที หรือฟังปอดแล้วมีเสียง wheezing
๙. ผู้ป่วยหอบร่วมกับมีภาวะหายใจเหนื่อยหอบ ปีกจมูกบาน ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง หน้าอกบวม



โรงพยาบาลศิริราช

หน้าที่ ๑/๒

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๐๑

แก้ไขครั้งที่ : ๐๒

เรื่อง : แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเข้า ER/OPD/LR

วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER/OPD/LR

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรณ

๑๐. ผู้ป่วยไข้สูง ซึม หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลียมาก
๑๑. ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิต $\geq 210/110$ หรือตัวโต ตัวหนึ่ง และ $\leq 90/60$ mmHg ร่วมกับการอ่อนเพลีย หน้าซีด มึนศีรษะ หรืออาการไม่คงที่
๑๒. ผู้ป่วยที่มีค่าน้ำตาลในเลือด ≥ 350 mg% และ ≤ 80 mg% ร่วมกับมีอาการ เช่น ใจสั่น เวียนศีรษะ เหงื่อแตก ตัวเย็น
๑๓. ผู้ป่วยถ่ายเหลว มีภาวะ severe dehydration (ตาลึกโหล ปากแห้ง กระหายน้ำ)
๑๔. ทารกแรกเกิด ๓-๔ วัน ตัวเหลืองร่วมกับซีม ไม่ดูดนม
๑๕. ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทุกระบบ pain score > 5 คะแนน (ตามแนวทางการคัดกรองโดยใช้ pain score)
๑๖. ผู้ป่วยมีอาการทางจิตอย่างรุนแรง (เอะอะ อาละวาด ก้าวร้าว) และ Hyperventilation Syndrom
๑๗. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ
๑๘. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพปกติ แต่มีอาการปวดมึนศีรษะ หรืออ่อนเพลียมาก ไม่สามารถนั่งรอตรวจได้
๑๙. ผู้ป่วยเปลอนอน / เปลนึ่ง (จากความเจ็บป่วยไม่ใช่จากความพิการ)
๒๐. ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องน้อยข้างขวา

ลงชื่อ

(นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ)
เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรณ)
ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช