

		โรงพยาบาลศิริสาร	หน้าที่ ๑/๑
นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๒๒			แก้ไขครั้งที่ : ๒
เรื่อง : แนวทางการเจาะคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิด			วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : LR			
ผู้จัดทำ : PCT		ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ	
นโยบาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานห้องคลอด ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน วิธีปฏิบัติ ๑. ประเมินทารกแรกเกิดที่อายุครบ ๔๘ ชั่วโมง(๒ วันหลังคลอด) ๑.๑ตรวจสอบใบลงข้อมูลการเจาะส้นเท้า ๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลทารกที่จะนำมาเจาะส้นเท้าใน OPD Card บุตรและสมุดสีชมพู ๑.๓ สอบถามชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด ของทารกแรกเกิดกับมารดา ก่อนนำทารกมาเจาะเลือด ๑.๔ อธิบายถึงเหตุผลของการเจาะคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์แก่มารดา ก่อนที่จะนำทารกแรกเกิดมาเจาะเลือด ๑.๕ นำทารกแรกเกิดที่มีอายุครบ ๔๘ ชั่วโมง(๒ วันหลังคลอด)มาเจาะเลือด ๑.๖ ลงบันทึกข้อมูลการเจาะเลือดในสมุดสีชมพู และใน OPD Card บุตร ๒. ก่อนจำหน่ายมารดาและบุตร สอบถามมารดาเกี่ยวกับการเจาะส้นเท้าของบุตร และตรวจสอบความเรียบร้อยของเวชระเบียนเกี่ยวกับรายละเอียดการเจาะส้นเท้าทั้งในสมุดสีชมพู และ OPD Card บุตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบุตรไม่ได้รับการเจาะส้นเท้า			
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	
(นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ) เลขานุการคณะกรรมการ PCT	(แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ) ประธานคณะกรรมการ PCT	(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร	