



รพ.ศิริสาคร

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI - PCT - ๐๗๙

แก้ไขครั้งที่ : ๐

เรื่อง : CPG neonatal sepsis


วันที่ประกาศใช้ : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : LR PP ER

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์มรรคาน เจ๊ะหลี

เรื่อง Neonatal Sepsis



ลงชื่อ

(นางโฮยทรง นาวา)
เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์มรรคาน เจ๊ะหลี)
ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาคร



รพ.ศิริสาคร

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-PCT-๘๐

แก้ไขครั้งที่ : ๐

เรื่อง : CPG neonatal severe sepsis

วันที่ประกาศใช้ : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : LR PP ER

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์มรรคน เจ๊ะหลี

Neonatal Severe sepsis& Septic shock

● ภาวะ Sepsis ร่วมกับ

- Hypotension โดยที่ MBP < GA หรือ

BW < ๑,๐๐๐ g SBP < ๔๕ mmHg

BW ๑,๐๐๐-๑,๙๙๙ g SBP < ๕๐ mmHg

BW ๒,๐๐๐-๒,๙๙๙ g SBP < ๕๕ mmHg

BW ≥ ๓,๐๐๐ g SBP < ๖๐ mmHg

- HR > ๑๘๐/min

- Organ dysfunction

Early resuscitation

แพทย์

๑. IV access ถ้าเปิดเส้นไม่ได้ในเวลา ๕ นาที พิจารณาใส่ UVC . ในรายที่สายสะดือแห้ง พิจารณาทำ Intraosseous
๒. NSS ๑๐ ml/kg in ๓๐ min; Max. ๒ doses
๓. ถ้า Perfusion ไม่ดีขึ้นหรือ Hypotensionหลังให้ NSS loading พิจารณา Inotrope : Dopamine ๑๐ µg/kg/min
๔. Correct ภาวะ Hypoglycemia (keep DTX ≥ ๖๐ mg%)
๕. ถ้ามี impending respiratory failure พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ
๖. Empirical ATB ภายใน ๑๕ นาที (ATB ตาม CPG neonatal sepsis)

พยาบาล

๑. รายงานแพทย์ด่วน
๒. เปิด IV ๒ เส้น ด้วย medicut No. ๒๔
๓. DTX
๔. Record V/S , Conscious ทุก ๑๕ นาที
๕. ประเมินการหายใจ และเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจให้พร้อม
๖. ใส่สายสวนปัสสาวะ

Consult & Refer รพ.นร

ลงชื่อ

(นาง)ไฮ้ทรง นาวา

เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นาย)แพทย์มรรคน เจ๊ะหลี

ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นาย)แพทย์ประมวล ทองอินทรราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาคร



รพ.ศิริสาคร

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : WI-PCT -๐๘๘

แก้ไขครั้งที่ : ๐๒

เรื่อง : แนวทางการประเมิน Sepsis โดยการใช้การประเมิน qSOFA

วันที่ประกาศใช้ : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์มรรคาน เจ๊ะหลี

แบบประเมิน Sepsis แบบประเมิน qSOFA ในหัวข้อซีมลง ปรับใช้ GCS $\leq$ ๑๔ คะแนน (Drop ๑ คะแนน)

ตำแหน่งที่สงสัย Infection

- ☐ Respiratory tract
☐ Gastrointestinal tract
☐ Genitourinary tract
☐ Soft tissue
☐ CNS
☐ Cardiovascular
☐ Tropical infection
☐ Other ระบุ.....



qSOFA

- ☐ SBP $\leq$ ๑๐๐ mm.Hg
☐ RR $\geq$ /min
☐ GCS $\leq$ ๑๔ คะแนน (Drop ๑คะแนน)

(Sign infection + qSOFA ๒ ข้อขึ้นไป = Sepsis)

ชื่อ - สกุล HN วันที่ เวลา

หมายเหตุ: PSOS Score $\leq$ ๔ คะแนน เข้า ER หาก Tepid sponge PSOS Score $\leq$ ๔ คะแนน ส่งตัวกลับ OPD

ลงชื่อ

(นางไธยทรง นาวา)
เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์มรรคาน เจ๊ะหลี)
ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทรราช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาคร