



โรงพยาบาลศิริสาร

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๐๘

แก้ไขครั้งที่ : ๒

เรื่อง :แนวทางการฉีดวัคซีนกรณีฉีด และ ผิดนัด

วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เวชปฏิบัติ/ER

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ

นโยบาย

เพื่อให้พยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานเวชปฏิบัติ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

วิธีปฏิบัติ

๑.กรณีที่เด็กฉีดวัคซีนผิดนัด ให้ปฏิบัติดังนี้

ครั้งที่	ช่วงอายุ ๑ ถึง ๖ ปี		ตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป		ข้อแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
๑	แรกพบ ๐	DTP-HB OPV๑,BCG	แรกพบ ๐	dT ๑,OPV๑,BCG	BCGให้กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ปรากฏว่าได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่มีแผลเป็นที่ไหล่เลย BCG จะไม่ให้ในเด็กที่เกิดจาก มารดาติดเชื้อ HIV เด็ดขาด หรือเด็กแสดงอาการของโรค เอดส์ การนัดในแต่ละครั้งให้ห่างกัน อย่างน้อย ๒๘ วัน เพื่อป้องกัน อาการข้อเคียงจากวัคซีน (AEFI) HB๑ ต้องห่างจาก HB๓ นาน ๖ เดือนเท่านั้น กรณีเด็ก ที่มีอายุในช่วง ๑-๖ ปี อาพิจารณาให้ตามปกติได้เมื่อ ทันตามเกณฑ์ของอายุเด็ก
๒	๑	MMR สำหรับเด็ก ๙ เดือน	๑	MMR สำหรับเด็ก ๙ เดือน	
๓	๒	DTP-HB OPV๒	๒	dT ๒,OPV๒	
๔	๓	JE๑	๓	HB๑	
๕	๔	JE๒	๔	JE๑	
๖	๕	DTP-HB OPV๓	๕	JE๒	
๗	๑๒	DTP,OPV๔	๖	HB๒	
๘	๑๕	JE๓	๘	dT,OPV๓	
๙			๙	HB๓	
๑๐			๑๒	JE๓	



โรงพยาบาลศิริสาร

หน้าที่ ๑/๒

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๐๘

แก้ไขครั้งที่ : ๒

เรื่อง :แนวทางการนัดฉีดวัคซีนชนิดพิด และ ผิดนัด

วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เวชปฏิบัติ/ER

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ

หมายเหตุ

๑. ไม่ให้ DTP-HB ในเด็กต่ำกว่า ๖ สัปดาห์หรือ ๔๒ วัน และที่มีอายุครบ ๗ ปีขึ้นไปเด็ดขาด
๒. กรณีเด็กไม่มารับวัคซีนตามเกณฑ์ ให้เร่งการให้วัคซีน DTP-HB โดยเข็มที่ ๑ ห่างจากเข็มที่ ๒ อย่างน้อย ๒๘ วัน เข็ม ๓ ห่างจากเข็ม ๒ อย่างน้อย ๑ เดือน แต่เข็ม ๓ ต้องห่างจากเข็ม ๑ อย่างน้อย ๔ เดือน
๓. การให้วัคซีน MMR ในเด็ก ๙ เดือน ต้องเริ่มให้ในเด็กที่มีอายุครบ ๒๗๐ วันขึ้นไป (๙ เดือนเต็ม) เนื่องจากหากต่ำกว่านี้ จะไม่มีภูมิคุ้มกัน ต้องตามาฉีดซ้ำอีกครั้ง
๔. วัคซีน JE จะมี ๒ สายพันธุ์ คือ Beijing กับ Nakayama ทั้งสองรายการฉีดตำแหน่ง S รายละเอียดการให้บริการดังนี้ แต่ขณะนี้เราใช้ Nakayama สำหรับการตีความอายุ ให้ตีความตามตัวอักษรถ้าเด็กอายุ ๓ ปี พอดี ก็ให้ใช้สูตร มากกว่า ๓ ปี

JE สายพันธุ์	เด็กอายุ	ขนาดที่ใช้
Beijing	ต่ำกว่า ๓ ปี	๐.๒๕ CC.
	มากกว่า ๓ ปี	๐.๕ CC.
Nakayama	ต่ำกว่า ๓ ปี	๐.๕ CC.
	มากกว่า ๓ ปี	๑.๐ CC.

๕.วัคซีน dT

- dT ๒ เข็มจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ ๓ ปี
- dT ๓ เข็มจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ ๕ ปี
- dT ๔ เข็มจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ ๑๐ปี แต่เข็ม ๔ ต้องมาฉีดหลังได้เข็มที่ ๓ ครบ ๑๐ ปี
- dT ๕ เข็มจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ ๒๐ ปี เข็ม ๕ ๔ ต้องมาฉีดหลังได้เข็มที่ ๔ ครบ ๑๐ ปี

ลงชื่อ

(นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ)
เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ)
ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร

		โรงพยาบาลศิริสาคร	หน้าที่ ๑/๑
นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๒๔		แก้ไขครั้งที่ : ๒	
เรื่อง : แนวทางการฉีดวัคซีน BCGในทารกแรกเกิด		วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : LR			
ผู้จัดทำ : PCT		ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ	
นโยบาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน LR ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน วิธีปฏิบัติ - กำหนดให้มีการฉีดวัคซีน BCG ในทารกแรกเกิดที่คลอดที่รพ.ที่หน่วยงานห้องคลอด ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และวันหยุดราชการกรณีมีมารดาและบุตรจำหน่าย - อธิบายเหตุผลของการฉีดวัคซีน BCG ให้มารดาและบิดา ก่อนฉีดวัคซีน - บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน BCG ในสมุดสีชมพู และ OPD Card บุตร - ก่อนจำหน่ายตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน BCG ของทารกแรกเกิดในสมุดสีชมพู และ OPD Card บุตร			
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	
(นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ)	(แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ)	(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช)	
เลขานุการคณะกรรมการ PCT	ประธานคณะกรรมการ PCT	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาคร	