



โรงพยาบาลศรีสาคร

หน้า ที่ ๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : PCT-WI -๑๑๑

แก้ไขครั้งที่ : ๐

เรื่อง : แนวทางการควบคุมโรคหัด ในช่วงมีการระบาด

วันที่ประกาศใช้ : ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : OPD ER IPD

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช

ผู้ป่วยสงสัยโรคหัดตามเกณฑ์คัดกรอง

หากไม่เข้าเกณฑ์คัดกรอง แต่มีประวัติ incomplete vaccine ให้ออกใบนัดเพื่อ มาฉีด vaccine

1. ให้ผู้ป่วยและผู้ปกครอง ใส่ Mask ตลอดเวลา ขณะรอตรวจ
2. แยกผู้ป่วยไว้บริเวณจุดแยกโรคระบบหายใจ หรือห้องแยก ER
3. ห้ามทำหัตถการ suction / ฟันยา จนกว่าผู้ป่วยจะพบแพทย์
4. กรณีทำหัตถการ suction / ฟันยา สวม PPE, N95, face shield, CPE

แพทย์สงสัยโรคหัดส่ง Measle IgM และแจ้งทีมระบาดสืบสวนโรค

ค้นหาผู้สัมผัส มีประวัติสัมผัส 4 วันก่อนถึง 4 วันหลังจากมีผื่นขึ้น
-ผู้สัมผัสร่วมบ้าน คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านและยังไม่ป่วยเป็นโรคหัด
-ผู้ร่วมงานหรือร่วมห้องเรียนที่ต้องอยู่ในห้องเดียวกันเป็นประจำ

Vitamin A supportive

OPD Case

IPD Case

- 1.ฉีด Ring Vaccine (Postexposure Prophylaxis, PEP) ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย
- 2.แจ้งผู้สัมผัสถึงความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคหัด สังเกตอาการ 21 วัน นับจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายกับผู้ป่วยติดเชื้อ
- 3.ผู้สัมผัสควรหลีกเลี่ยงการพบปะกับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 เดือนหรือ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน) โรงพยาบาล สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วย ภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงเวลาเฝ้าระวังอาการ

โรงเรียน

- 1.ตรวจสอบการได้รับวัคซีนของนักเรียนในโรงเรียนและให้วัคซีนใน เด็กที่ยังไม่ได้รับตามช่วงวัยที่แนะนำ
- 2.กรณีนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมีอาการผื่นขึ้นและสงสัยโรค หัด ให้หยุดเรียนจนครบ 4 วันหลังจากมีผื่นขึ้น และพบแพทย์หากมี

- 1.แยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยกหรือ Cohort ward และ แขนวป่วยแจ้งเตือน อุปกรณ์ที่ใช้ให้แยกโซนชัดเจน, ผู้ เฝ้าไข้ได้ 1 คน และห้ามผู้อื่นเยี่ยม
- 2.บุคลากรที่จะดูแลผู้ป่วยต้องเคยเป็นหัดหรือเคยได้รับ วัคซีนป้องกันโรคหัด และสวมผ้าปิดปากจมูก ชนิด N 95 สวมถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทุกครั้งที่สัมผัสผู้ป่วย
3. ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากจมูก ชนิดธรรมดาตลอดเวลา ยกเว้นเวลา รับประทานอาหารและแปรงฟัน
- 4.เคลื่อนย้ายเมื่อจำเป็น รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับย้าย ทราบถึงการ แพร่กระจายเชื้อ

แยกโซน/กักตัว และหยุดเรียนจนครบ 4 วันหลังจากมีผื่นขึ้น

แหล่งอ้างอิง: แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคหัด (Measles) ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2567 กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบสอบสวนทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ลงชื่อ

(นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ)

เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์อิมรอน สะนึ)

ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาคร